

Size: 210x570mm

Bijlsuiter: informatie voor de gebruiker			
Nortriptyline RIA 10 mg en 25 mg tabletten Nortriptyline Lees goed de hele bijlsuiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar deze bijlsuiter. Misschien heeft u hem later weer nodig. - Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. - Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u. - Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijlsuiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.	Als u middelen tegen depressie (antidepressiva) zoals selectieve serotonine-heropnameremmers (SSRI's) neemt, kan uw dokter overwegen om de dosis van uw geneesmiddel te veranderen (zie ook rubriek 2 "Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?" en rubriek 3): - Als u zeer hoge koorts (hyperpyrexie) hebt. - Als u elektroconvulsieve therapie (ECT) krijgt (behandeling waarbij met behulp van een korte stroomstoot door het hoofd en epileptische aanval wordt uitgelokt). - Als u in het verleden een allergische reactie heeft gehad op een ander tricyclisch antidepressivum (groep antidepressieve middelen). Ouderen hebben meer kans op bepaalde bijwerkingen zoals duizeligheid bij het opstaan vanwege lage bloeddruk (zie ook rubriek 4 "Mogelijke bijwerkingen").	Duur van de behandeling Net zoals bij andere geneesmiddelen voor de behandeling van depressie kan het enkele weken duren voordat u zich beter begint te voelen. De duur van een behandeling voor depressie verschilt per persoon en bedraagt meestal minstens 6 maanden. Uw arts zal bepalen hoe lang de behandeling moet duren. Bij dit middel gebruiken zo lang als uw arts aanbeveelt. De onderliggende aandoening kan lang aanhouden. Als u te snel stopt met het gebruik van dit middel, kunnen de verschijnselen terugkeren.	- verlaagde natriumconcentraties in het bloed - ornust - problemen met slapen - dorst Soms (komt voor bij minder dan 1 op de 100 patiënten) - opwinding, angst, moeilijk kunnen slapen, nachmerries - stuipten - crampen - moeilijk kunnen slapen - verhoogde bloeddruk - diarree, braken - uitslag, huiduitslag met hevige jeuk en bultjes (netelroos, graafuiten), zwelling van het gezicht en de tong - moeilijk kunnen slapen - verhoogde melkproductie of melkproductie zonder borstvoeding - verhoogde druk in de oogbal - fluauvalen - verergering van hartfalen - verminderde werking van de lever (bijv. cholestatische leverziekte)
Inhoud van deze bijlsuiter - Wat is Nortriptyline RIA en waarvoor wordt dit middel gebruikt? - Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn? - Hoe gebruikt u dit middel? - Mogelijke bijwerkingen - Wanneer mag u dit middel niet gebruiken? - Inhoud van de verpakking en overige informatie	Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? Sommige geneesmiddelen kunnen een invloed hebben op de werking van andere geneesmiddelen, en dit kan soms ernstige bijwerkingen veroorzaken. Gebruikt u naast Nortriptyline RIA nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. - Valproic acid (geneesmiddel voor de behandeling van epilepsie en bij bipolaire stoornis) - monoamineoxidaseremmers (MAO-remmers) bv. moclobemide, fenelzine, iproniazide, isocarboxazide, nialamide of tranylcypromine (voor de behandeling van depressie) en fenelzine (voor de behandeling van de ziekte van Parkinson). Deze geneesmiddelen mogen niet samen met Nortriptyline RIA genomen worden (zie rubriek 2 "Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?") - amfetamine, efedrine, isoprenaline, norepinephrine, fenylefrine en fenylpropanolamine (kunnen zitten in bepaalde middelen tegen hoest of verkoudheid, en in sommige verdovingsmiddelen) - geneesmiddel om hoge bloeddruk te behandelen bijvoorbeeld calciumkanaalblokkers (groep bloeddruckverlagende middelen, zoals diltiazem en verapamil), guanethidine, debrisoquine, betandine, clonidine, reserpine en methyldopa - anticholinerge geneesmiddelen (middelen die spierbewegingen remmen), waaronder bepaalde geneesmiddelen voor de behandeling van de ziekte van Parkinson en maag-darmstoornissen (bijvoorbeeld atropine, hyoscynamine), thioridazine (gebruikt voor de behandeling van schizofrenie, een geestesziekte met verschijnselen als waanden, waarneming van dingen die er niet zijn en geleidelijke verandering van de persoonlijkheid) - suprenorfine. Deze geneesmiddelen kunnen een interactie hebben met nortriptyline tabletten. U kunt symptomen ervaren zoals onwillekeurige, ritmische samenrekkingen van het spier, met inbegrip van de spieren die beweging van uw controle, agiotie, hallucinaties, coma, overmatig zweten, tremor, overdriving van reflexen, verhoogde spierspanning, lichaamstemperatuur boven 38 ° C. Neem contact op met uw arts wanneer u dergelijke symptomen ervaart. - geneesmiddelen voor bepaalde hartaandoeningen (bijvoorbeeld beta-blokkers en antiaritmica) - emetine (voor de behandeling van maagzweten) - methyfenidat (voor de behandeling van ADHD) - orale anticonceptiva (middelen om zwangerschap te voorkomen die via de mond moeten worden ingenomen) - rifampicine (voor de behandeling van infecties) - fenytoïne en carbamazepine (voor de behandeling van epilepsie) - Sint-Janskruid (Hypericum perforatum) een kruidengeneesmiddel tegen depressies. - geneesmiddelen voor de schildklier	Verminderde werking van de lever Patiënten met leverziekte of mensen die een trage stofwisseling hebben krijgen meestal lagere doses. Uw arts kan bloedmonsters nemen om de concentratie van nortriptyline in het bloed te bepalen.	Zelden (komt voor bij minder dan 1 op de 1000 patiënten) - algemeen eetlust - plotselinge verwardheid (delirium), vooral bij oudere patiënten, hallucinaties (vooral bij patiënten met schizofrenie) - afwijkingen in het hartritme of het hartslagpatroon - zwelling van de speekselklieren - hartruilt - verhoogde gevoeligheid voor zonlicht - vergroting van de borsten bij mannen - koorts - gewichtsverlies - afwijkende resultaten van leverfunctietesten (test voor de werking van de lever)
1. Wat is Nortriptyline RIA en waarvoor wordt dit middel gebruikt?	Nortriptyline RIA bevat de werkzame stof nortriptyline, een middel tegen onder andere een depressieve stemming (tricyclisch antidepressivum).	Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? Nortriptyline RIA wordt gebruikt voor de behandeling van depressie (ernstige depressieve episoden) bij volwassenen.	Zeer zelden (komt voor bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten) - gevoel van innerlijke onrust en dwingende behoefte om constant in beweging te zijn - stooms van de perifere zenuwen (zenuwen buiten het centrale zenuwstelsel) - plotselinge verhoging van de oogdruk - specifieke vormen van een ongewoon hartritme (torsade de pointes) - allergische ontsteking van de longblaasjes en van het longweefsel
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?	Wanneer mag u dit middel niet gebruiken? - U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. - Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6. - U hebt kortgeleden een hartinfarct (myocardinfarct) gehad - U hebt hartproblemen zoals hartritmestoornissen die op een ECG (hartfilmpje) gezien worden, of een bepaalde stoornis in de prikkelgeleiding van het hart, leidend tot hartfistmestoornissen (hartblok), of een aandoening van de kransslagader - U gebruikt geneesmiddelen die monoamineoxidaseremmers (MAO-remmers; groep antidepressieve middelen) worden genoemd - U hebt in de afgelopen 14 dagen MAO-remmers (groep antidepressieve middelen) gebruikt - U hebt een dag eerder moclobemide (een bepaalde MAO-remmer, gebruikt voor de behandeling van depressie) gebruikt - U hebt een ernstige leveraandoening	Uw arts zal bepalen of u de behandeling van depressie (ernstige depressieve episoden) moet stoppen met het gebruik hiervan en minstens 14 dagen wachten voordat u begint met het gebruik van een MAO-remmer.	Niet bekend (de frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald) - afwezigheid van eetlust - verhoging of verlagng van bloedsuikerspiegel - het gevoel van de galen gebouwen, achtervolgd of bedreigd te worden, zonder dat dit het geval is (paranoia) - bewegingsstoornissen (onvrijwillige bewegingen of minder bewegingen) - overgevoeligheidsontsteking van de hartsierp (myocarditis) - leverontsteking (hepatitis) - opvliegers - syndroom waarbij de hersenen een bepaald hormoon (anti-diuretisch hormoon) te veel aanmaken (syndroom van inadequate secretie van anti-diuretisch hormoon (SIADH))
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt. U kunt hartfistmestoornissen en lage bloeddruk krijgen als u een hoge dosering nortriptyline krijgt. Dit kan ook gebeuren bij gewone doseringen als u een al bestaande hartziekte heeft.	U moet het uw arts ook laten weten als u geneesmiddelen gebruikt, of kort geleden heeft gebruikt, die het hartritme kunnen beïnvloeden, zoals: - geneesmiddelen voor de behandeling van onregelmatige hartslag (zoals kinidine en sotalol) - astemizol en terfenadine (voor de behandeling van allergieën en hoestkoorts) - geneesmiddelen voor de behandeling van bepaalde geestesziekten (zoals pimozide en sertindol) - cisapride (voor de behandeling van bepaalde soorten spierverspingsstoornissen) - ralofantrine (voor de behandeling van malaria) - methadon (voor de behandeling van pijn en voor het tegengaan van de gevolgen van (voornamelijk alcohol- en drugs-)vergiftiging) - diuretica (middelen om beter te kunnen slapen zoals furosemide)	Bent u vergeeten dit middel in te nemen? Neem de volgende dosis op het gewone tijdstip in. Neem geen dubbele dosis om een vergeeten dosis in te halen.	Het melden van bijwerkingen Krijgt u veel last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijlsuiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Website: www.lareb.nl

Description	Nortriptyline Leaflet
Market	Netherlands
Language	Dutch
Version no.	CorelDRAW 10
Size	210x570 mm
Min. Font Size	Arial, 9 pt